



IMPACTO DEL DOLOR CRÓNICO EN ESPAÑA

PREVALENCIA:

España



Europa



TRASTORNOS ASOCIADOS:



CUADRO DEPRESIVO

47 %³

TRASTORNOS del SUEÑO

50 %³

QUÉ PIENSAN LOS PACIENTES QUE LO PADECEN:

FALTA CONCIENCIACIÓN y CONOCIMIENTO



62 %³

mi ENTORNO duda de la EXISTENCIA REAL de su dolor



47 %³

impacto NEGATIVO en la familia



36 %³

me siento SOCIALMENTE AISLADO



27 %³

1. Breivik H, Collett B, Ventafridda V, Cohen R, Gallacher D. Survey of chronic pain in Europe: prevalence, impact on daily life, and treatment. Eur J Pain. 2006;10(4):287-333. DOI:10.1016/j.ejpain.2005.06.009

2. Català E, Reig E, Artés M, Aliaga L, López JS, Segú JL. Prevalence of pain in the Spanish population: telephone survey in 5000 homes. Eur J Pain. 2002;6(2):133-40. DOI:10.1053/eujp.2001.0310

3. Pérez C, Ribera MV, Gálvez R, Micó JA, Barutell C, Failde I, Sánchez-Magro I, Stern A. High prevalence of confirmed, but also of potential and believed, neuropathic pain in pain clinics. Eur J Pain. 2013;17(3):347-56. DOI:10.1002/j.1532-2149.2012.00204.x

4. Torralba A, Miquel A, Darba J. Situación actual del dolor crónico en España: iniciativa "Pain Proposal". Rev Soc Esp Dolor. 2014; 21(1): 16-22.