






# PSA para la detección precoz del cáncer de próstata

## ¿Qué dicen las guías?

### medifichas



#### Asociación Europea de Urología 2020<sup>1</sup>

- Realizar tacto rectal y determinar el PSA a hombres bien informados que lo soliciten.
- Ofrecer el análisis de PSA a los siguientes grupos de riesgo de cáncer de próstata:
  - Hombres >50 años
  - Hombres mayores de 45 años con antecedentes familiares de cáncer prostático.
  - Hombres de ascendencia africana mayores de 45 años
  - Hombres portadores de mutaciones *BRCA2* mayores de 40 años
- Hacer seguimiento cada 2 años en los hombres con:
  - PSA >1 ng/ml a los 40 años
  - PSA >2 ng/ml a los 60 años
 Si el PSA basal es normal: seguimiento cada 8 años
- Detener el seguimiento en función de la esperanza de vida (si es <15 años, el beneficio es improbable) y el estado funcional.

#### Asociación Americana de Urología 2013 (revisadas en 2018)<sup>2</sup>

- En hombres entre 55 y 69 años, recomienda un modelo de decisión compartida, procediendo según las preferencias del paciente.
- Seguimiento cada 2 años en los que decidan que sí, ajustando el intervalo según el valor del PSA.
- Fuera de este rango de edad, NO se recomienda el cribado.
- Excepción: hombres entre 40 y 54 años con elevado riesgo de cáncer de próstata, en cuyo caso la decisión debe individualizarse.

#### US Preventive Services Task Force (USPSTF) 2017<sup>3</sup>

- En hombres entre 55 y 69 años, recomienda una decisión personal, tras analizar con el paciente los potenciales beneficios y perjuicios.
- NO recomienda el cribado en >70 años.
- No encuentra evidencia suficiente para hacer recomendaciones aparte para los afroamericanos, los hombres con antecedentes familiares de cáncer de próstata o los grupos de riesgo menores de 55 años.

### ¿En qué coinciden todas las guías?

- SIEMPRE hay que asegurarse de que el paciente entiende los riesgos y beneficios, y tomar la decisión según sus preferencias
- NO se recomienda el cribado en hombres con una esperanza de vida <10-15 años

PSA: antígeno específico prostático

descárgate más medifichas en [www.almirallmed.es](http://www.almirallmed.es)

1. Mottet N, van der Bergh RCN, Briers E, et al. EAU-EANM-ESTRO-ESUR-SIOG Guidelines on Prostate Cancer-2020 Update. Part 1: Screening, Diagnosis, and Local Treatment with Curative Intent. *Eur Urol.* 2021;79(2):243-62.  
 2. Carter HB, Albertsen PC, Barry MJ, et al. *American Urological Association (AUA) Guideline: Early Detection of Prostate Cancer (2018)*. American Urological Association. 2018.  
 3. US Preventive Services Task Force. *Screening for Prostate Cancer: US Preventive Services Task Force Recommendation Statement.* *JAMA.* 2018;319(18):1901-13.