

La elección entre los ARM para la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida^{1,2}

Vía oral
30 comprimidos recubiertos con película

EPLERENONA DESDE EL INICIO, PARA TODOS LOS PACIENTES CON IC-Fer, PARA REDUCIR LA MORTALIDAD^{2,4-7}



Cuádruple terapia como inicio de tratamiento de la IC-Fer, con el objetivo de reducir la mortalidad¹



*ARA-II en el caso de pacientes intolerantes a IECA o INRA. **En ambos grupos de tratamiento, en adición de la terapia recomendada, incluyendo BB.

EPLERENONA VS. ESPIRONOL ACTONA³



En un estudio de vida real vs. espironolactona en pacientes con IC-Fer, eplerenona demostró:



Accede a la Ficha Técnica:

Elecor® 25 mg comprimidos recubiertos con película x 30 comprimidos: 26,68 €. Elecor® 50 mg comprimidos recubiertos con película x 30 comprimidos: 53,34 €. Condiciones de prescripción y dispensación: Con receta médica. Aportación Reducida. Bajo licencia Pfizer.

Fecha de elaboración del material: marzo 2026.

Acronimos: ARA-II: antagonistas del receptor de angiotensina II; ARM: antagonistas del receptor de mineralocorticoides; BB: bloqueadores β; CV: cardiovascular; EA: eventos adversos; FEVI: fracción de eyección del ventrículo izquierdo; IC: insuficiencia cardíaca; IC-Fer: insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida; IECA: inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina; INRA: inhibidores de la neprilisina y el receptor de la angiotensina; iSGLT2: inhibidores del cotransportador de sodio-glucosa tipo 2; NYHA: New York Heart Association; RR: riesgo relativo.

Referencias: 1. McDonagh TA, Metra M, Adamo M, et al. 2021 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure. Eur Heart J. 2021;42(36):3599-726. 2. Elecor®. Ficha Técnica. Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Centro de Información del Medicamento. Fecha de acceso: marzo 2026. Disponible en: https://www.aemps.gob.es/cima/pdfs/es/ft/66756/FT_66756.pdf. 3. Pardo-Martínez P, Barge-Caballero E, Bouzas-Mosquera A, et al. Real world comparison of spironolactone and eplerenone in patients with heart failure. Eur J Intern Med. 2022;97:86-94. 4. Pitt B, White H, Nicolau J, et al. Eplerenone reduces mortality 30 days after randomization following acute myocardial infarction in patients with left ventricular systolic dysfunction and heart failure. J Am Coll Cardiol. 2005;46(3):425-31. 5. Pitt B, Gheorghiade M, Zannad F, et al. Evaluation of eplerenone in the subgroup of EPHEUS patients with baseline left ventricular ejection fraction <or=30%. Eur J Heart Fail. 2006;8(3):295-301. 6. Pitt B, Remme W, Zannad F, et al. Eplerenone, a selective aldosterone blocker, in patients with left ventricular dysfunction after myocardial infarction. N Engl J Med. 2003;348(14):1309-21. 7. Zannad F, McMurray JJ, Krum H, et al. Eplerenone in patients with systolic heart failure and mild symptoms. N Engl J Med. 2011;364(1):11-21.